

AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ SAVAŞIMINDA KAPAR® Akdeniz Meyve Sineği Tuzağı



Türkçe ismi : Akdeniz Meyve sineği
Bilimsel ismi : *Ceratitis capitata* Wied. (Dip. : Tephritidae)
İngilizce ismi : Mediterranean fruit fly ,medfly
Konukçuları : Polifag bir zararlıdır. Ülkemizde tespit edilen en önemli konukçuları kayısı, ayva, şeftali, incir, trabzon hurması, nar, avokado ve limon çeşitleri hariç turuncgillerdir. Tercih ettiği konukçuların mevcut olmadığı hallerde tali konukçuları olan armut, hint inciri, ünnap, elma ve yabani türlerde yaşayışını devam ettirebilme potansiyeline sahiptir.

KİMYASAL MÜCADELEDE İLAÇLAMA ZAMANININ SAPTANMASI

Yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan üreticiler Akdeniz meyve sineğine karşı ilaçlama yapmalarına rağmen başarısız olurlar. Bunun en önemli nedeni ilaçlama zamanının doğru olarak saptanamamasıdır. Akdeniz meyve Sineği, erginlerinin yumurtalarını meyve kabuğunun altına bırakmalarından sonra , yapılacak mücadele başarısız olur. Yine, AMS erginleri çıkmamış, uçuş başlamamışsa ilaç atmak, emek ve para kaybının yanı sıra çevreyi kirletmekten başka bir işe yaramaz. Kısaca, ilaçlama zamanını tam olarak bilmek kimyasal mücadelenin birinci şartıdır. Bunun için ;

Akdeniz meyve sineğinin yumurta bırakma zamanı her meyveye göre değişir, meyvelerin rengi yeşilden sarıya dönmeye başladığında AMS leri yumurtalarını bırakabilir. Ayrıca, yukarıda belirtilen aylarda içerisinde cezbedici olarak Trimedlure tuzaklar veya %2 Amonyum fosfat içeren McPhail tuzakları asılarak sinek çıkışları takip edilir. Söz konusu kontrollerde tuzaklarda ilk sinek yakalandığında meyvelerin rengi yeşilden sarıya dönmeden 7-10 gün önce ilaçlama yapılır. İlaçlamadan sonra tuzaklarda sinek yakalanma devam ediyorsa 7- 10 gün ara ile hasada 10 gün kalıncaya kadar ilaçlamaya devam edilir. Günlük sıcaklık 16 °C'nin altına düştüğünde ilaçlama gerek duyulmaz.

BİYOTEKNİK MÜCADELE=İLAÇSIZ MÜCADELE

Bu mücadele tekniğinde pestisit adı verdiğimiz zehirli kimyasal maddeler kullanılmaz. Akdeniz meyve sinekleri yakalanarak öldürülür. Bu teknik daha az emek ister,daha ucuzdur. En önemlisi, ekolojik denge bozulmaz, üründe ilaç kalıntısı olmaz. Ürün daha yüksek fiyatla satılır. Halk sağlığı yönünden önerilen bir mücadele tekniğidir.

AMS polifak bir zararlı olduğu için yıl boyunca gıda ve konukçu bulabilir. Kışlayan döl ergin çıkışı ilkbahar sonu, yaz başlarında olur. Sıcaklığın 16 °C nin üzerinde olduğu günlerde çiftleşip yumurta bırakırlar. Ege Bölgesinde yılda 4-5, Akdeniz Bölgesinde ise 7-8 döl verebilir. Bu nedenle zararlının, her döl ergin uçuşu tuzaklarla kontrol edilmeli, tuzaklarla mümkün olduğunca çok ergin sinek yakalanarak, popülasyon azaltılmalıdır. Bunun için ;

Meyvelelerin çiçek döneminden sonra, hektara 3 adet KAPAR® Akdeniz Meyve Sineği Tuzağı ağaçlara boy hizasında asılır. Haftada bir kez sayım yapılarak kaydedilir.

Meyvelerin renginin yeşilden sarıya dönmeye başladığı dönemde meyveler yumuşar, AMS nin yumurtalarını bırakabileceği yumuşaklığa ulaşır. Bundan 7-10 gün önce , 15-20 m aralıklarla KAPAR® Akdeniz Meyve Sineği tuzakları asılarak kitle yakalama tekniği uygulanır. AMS yoğunluğu yüksekse ilaçlama yapılır.

IPM, Organik , Konvensiyonel ve İyi Tarım Uygulamalarında kullanınız.

KAPAR ORGANİK TARIM SANAYİİ TİCARET LTD.ŞTİ.
İvedik Organize Sanayii Bölgesi. 1122. Cad. 1463. Sok. No : 16
06370 OSTİM / ANKARA/TURKEY

Tel. : 0.312. 395 22 79
Fax : 0.312. 380 64 44
E-mail : kapar_kapar@hotmail.com.
Http://www.kaparorganik.com.tr/

