



DEPO ZARARLISI GÜVELERE KARŞI KAPAR® Feromon Tuzakları



Ephestia kuehniella, (Lep. Pyralidae) : Mediterranean Flour Moth , Değirmen güvesi, un güvesi, un kurdu.

Ephestia elutella (Lep. Pyralidae) : Tobacco Moth ,Tütün güvesi, üzüm güvesi.

Ephestia figulilella (Lep. Pyralidae) : Raisin moth ,Kuru incir güvesi, Kuruüzüm güvesi, Üzüm güvesi.

Ephestia cautella (Lep. Pyralidae) : The Almond moth ,İncir kurdu, Kuruincir kurdu, Kuruincir güvesi, İncir güvesi.

Plodia interpunctella (Lep. Pyralidae) : Indian meal moth , Driedfruit moth, Kurumeyve güvesi, Antepfıstığı kuru meyve güvesi, Ceviz-badem iç güvesi, İki renkli güve.

ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ

Ambar zararlıları, hububat, un ve makarna gibi undan üretilen maddelerde. Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, iç fındık başta olmak üzere kuru meyvelerde. Kestane, ceviz, antepfıstığı, yer fıstığı, badem, susam, ayçiçeği vb. yağlı tohumlarda. Kakao, süt tozu, baharat, keçiyoynuzu gibi gıda maddelerinde ve kuru tütünde zararlıdır. Bu zararlılar, bulaştıkları ürünlerde ağırlık ve kalite kaybına neden olurlar. Yoğun bulaşmalarda üründe küflenme, kızışma, kokuşma ortaya çıkar.

DEPO ZARARLILARI İLE MÜCADELE

Temiz Ürün ;

Depo zararlıları ile mücadelede temel ilke temiz ambara temiz ürün koymak ve ürünü depolama süresince bulaşmalardan korumaktır. Bu zararlılar doğada her zaman vardır. Bu nedenle ürünler hızla kurutulmalı ve ambara taşınmalıdır. Kurutma ve ambalajlama sırasında, bulaşma olmaması için ışık tuzakları ve feromon tuzakları kullanılmalı. Bulaşma tespit edildiğinde zaman kaybedilmeden, kimyasal mücadeleye geçilmelidir.

Temiz Ambar ;

Ambarda bir önceki yıldan kalan ürün artıkları temizlenir. Çuval, utu, sepet vb. ambalaj materyali fümige veya imha edilir. Ürün ambara konulmadan önce, taban, tavan, ve duvardaki yarıklar ve çatlaklar sıvanır. İç ve dış yüzeyleri kireçle badana yapılır. Pencere ve havalandırmalara elek teli takılır. Ürün neminin % 13 ün, ambar sıcaklığının 15 °C nin altında olmasına özen gösterilir. Ürün ambalajlı ve çuvalı ise ızgaralar üzerine konur. Dökme ise küçük yığınlar yapılır. Ürünle duvar arasında 0.5 m boşluk bırakılır.



Organik tarımsal üretimin hiçbir aşamasında pestisit kullanılmaz. Bu nedenle kültürel ve mekanik mücadeleye önem verilir. Bu amaçla feromon ve ışık tuzakları daha sık kullanılmalıdır.

İyi tanımlı IPM ve konvansiyonel tarımda doku anbarda bulaşma olup olmadığı, dışarıdan bulaşık ürün getirilip getirilmediğinin bilinmesi için, KAPAR® FEROMON TUZAKLARI olarak izlenebilir. Şaşırtma ve kitle yakalama tekniği uygulanır.



IPM, Organik , Konvansiyonel ve İyi Tarım Uygulamalarında kullanınız.

KAPAR ORGANİK TARIM SANAYİİ TİCARET LTD.ŞTİ.
İvedik Organize Sanayii Bölgesi. 1122. Cad. 1463. Sok. No : 16
06370 OSTİM / ANKARA/TURKEY

Tel. : 0.312. 395 22 79 / 395 55 53
Fax : 0.312. 380 64 44
E-mail : kapar_kapar@hotmail.com.
Http://www.kaparorganik.com.tr/

